


PIADIN®

Erfolgsrezept für bedarfsgerechte Stickstoffversorgung

Mit PIADIN® können organische Düngemittel frühzeitig in der noch kühlen und feuchten Jahreszeit ohne das Risiko von Stickstoffverlusten aus der Nitratform ausgebracht werden. Die PIADIN®-Zugabe ermöglicht die Zusammenlegung von Teilgaben. Durch die verzögerte Nitratbildung können Sie je nach Kultur die gesamte Gülle- oder Gärsubstratmenge an einem einzigen Termin ausbringen.

- ➔ Mehr Ertrag
- ➔ Zusammenfassung von Gülle-Teilgaben bricht Arbeitsspitzen
- ➔ Mehr Flexibilität durch mögliche frühere Düngetermine
- ➔ Höhere Stickstoffeffizienz durch Reduzierung von N-Verlusten

PIADIN® erhöht den Ertrag und verbessert die Stickstoff-Effizienz



Empfehlung zur Piadin®-Dosierung (l/ha)	Februar	März	April
Mais, Zuckerrüben, Kartoffeln	-	6 *	5 *
Grünland	5	4	-
Winterroggen, Wintergerste, Raps	6	5	4
Winterweizen	7	6	5

* Bei Strip Till Im Mais sind nur 3 l/ha nötig.

Je geringer der zeitliche Abstand zwischen Anwendung und Haupt-Stickstoff-Aufnahme der Pflanzen, desto niedriger ist die notwendige PIADIN®-Aufwandmenge.